PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR

Cláudia Vallone Silva
Enf^a Serviço de Controle de Infecção Hospitalar HIAE
Mestre em Ciências da Saúde UNIFESP
Especialista em Gerenciamento de Enfermagem

Pioneira do controle de infecção e epidemiologia hospitalar/1863

Hospital de campanha para atendimentos de feridos da Guerra da Criméia

- Principal arma que Florence Nightingale utilizou foram os dados;
- Se preocupava com a melhora do atendimento médico mas também se preocupou com a organização;
- Foi pioneira na utilização de gráficos, para apresentar dados em uma forma clara que mesmo os generais e membros do parlamento pudessem compreender.

3 categorias: azul para mortes infecciosas evitáveis; em vermelho - ferimentos de batalhas; em preto - demais causas.

Pioneira do controle de infecção e epidemiologia hospitalar/1863

Hospital de campanha para atendimentos de feridos da Guerra da Criméia

- Seus argumentos comprovam a relação direta entre as condições sanitárias e as complicações pós-operatórias
- Valoriza práticas de higiene como: limpeza do ambiente, preparo adequado de alimentos, troca de roupa de cama, área física, fluxos de materiais limpos e sujos e até controle de ar ambiente

Taxa de mortalidade por cólera, tifo e disenteria passa de 42% para 2% depois que as medidas foram instaladas

“TALVEZ PAREÇA ESTRANHO ENUNCIAR COMO
PRIMEIRO DEVER DE UM HOSPITAL NÃO
CAUSAR MAL AO PACIENTE.”

Florence Nightingale

Evolução dos cuidados ambientais

**Postura, Visão
Liderança**

Tecnologia

**Legislação e
referências
nacionais e
Internacionais**

Ecologia

**Atualização
Treinamento**

Saúde Ocupacional

Parcerias

OBJETIVO MAIOR

Higiene com Segurança e Qualidade

Referências importantes

Best Practices for
Environmental Cleaning
for Prevention and Control
of Infections

In All Health Care Settings - 2nd edition

Provincial Infectious Diseases
Advisory Committee
(PIDAC)

**2007 Guideline for Isolation Precautions:
Preventing Transmission of Infectious
Agents in Healthcare Settings**

**Management of
Multidrug-Resistant
Organisms In
Healthcare Settings,
2006**

First Published: December 2009
Revised: May 2012

Public Health Ontario
PARTNERING FOR HEALTH

Santé publique Ontario
PARTENARIAT POUR LA SANTÉ

Recommendations and Reports

June 6, 2003 / Vol. 52 / No. RR-10

**Guidelines for Environmental Infection Control
in Health-Care Facilities**

Recommendations of CDC and the Healthcare Infection
Control Practices Advisory Committee (HICPAC)

Evolução do conceito de Infecção

Infecção Hospitalar
ou Infecção Nosocomial

Infecção ocupacional

Infecção relacionada à Assistência à Saúde
IRAS

Preocupação com Segurança
para pacientes,
equipe de saúde e
comunidade

Hospitais
Centros de Hemodiálise e Quimioterapia
Centros de Reabilitação
Cirurgias Ambulatoriais
Casas de Longa Permanência
Cuidados em Homecare
Etc....

Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS)

- ❖ A prevenção e o controle das infecções representa uma das iniciativas mais importantes para a segurança do paciente;
- ❖ As IRAS são responsáveis por aumento de custos, do tempo de internação e da morbimortalidade;
- ❖ Para alcançar o sucesso em um PCIH é fundamental a:

Parceria entre as equipes multiprofissionais:
enfermagem, fisioterapia,
higiene, nutrição, etc

Recursos materiais

Equipe Médica

Serviços de Apoio

Equipe

Paciente

Equipe Profissional

Familiar Acompanhante

Equipe de enfermagem

Laboratório

Equipes Centro Cirúrgico, exames diagnósticos e terapêuticos, etc

Fisioterapia

Recursos humanos

Vigilância/Indicadores

Recursos estruturais

Cultura de Institucional de Segurança

Microrganismos

Hospedeiro susceptível

Reservatório

Cadeia de infecção

Porta entrada

Porta saída

Modo transmissão

Como são adquiridas estas infecções ?

✓ Contato

direto
indireto

✓ Gotículas

tosse, espirro, fala
distância <1m

✓ Aerossóis

Gotículas ressecadas($\leq 5 \mu$) ou pó
contendo microrganismos

Evidência simples:

A higienização das
mãos é a medida
mais eficaz para a
redução de IRAS!

Vamos assistir a um filme?

Como os microrganismos são transmitidos?

Lembre-se:

O produto alcoólico é o de escolha para a HM: possui boa atividade antimicrobiana, dispensa pia, reduz o tempo, previne ressecamento da pele das mãos e, se houver boa aceitação, eleva a adesão à HM.

Guideline for Hand Hygiene in Health-care Settings. *MMWR* 2002; vol. 51, no. RR-16

O ambiente é importante na transmissão das infecções?

- Superfícies ambientais podem realmente ser reservatório de microrganismo?
- Estas superfícies têm sido implicadas na transmissão endêmica ou epidêmica de IH?
- Pode o cuidado ambiental reduzir ou eliminar os microrganismos deste reservatório?
- Será que esta redução pode interferir nas taxas de IRAS?
- Caso todas estas respostas sejam afirmativas, qual o método mais eficiente para o cuidado ambiental?

Rutala WA, Weber DJ – ICHE/Aug 95

Evidências que nos fazem crer na importância do ambiente como fonte de transmissão de infecção

BOX 1: Criteria for Evaluating the Strength of Evidence for Environmental Sources of Infection

1. The organism can survive after inoculation onto the fomite.
 2. The organism can be cultured from in-use fomites.
 3. The organism can proliferate in or on the fomite.
 4. Some measure of acquisition of infection cannot be explained by other recognized modes of transmission.
 5. Retrospective case-control studies show an association between exposure to the fomite and infection.
 6. Prospective case-control studies may be possible when more than one similar type of fomite is in use.
 7. Prospective studies allocating exposure to the fomite to a subset of patients show an association between exposure and infection.
 8. Decontamination of the fomite results in the elimination of infection transmission.
-

Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)

Evolução dos cuidados ambientais

Atualmente

Vários microrganismos sobrevivem em superfícies ambientais!
Limpeza e Desinfecção

Década de 90

Ambiente não é tão importante!
Matéria orgânica SIM – Descontaminação
Limpeza ambiental

Década de 80

Desinfetantes em superfícies
Fenol sintético + Hipoclorito de Na

Década de 70

Conceito importante:

Área Crítica
Área Semi-crítica
Área não crítica

Superfície Crítica
Superfície Semi-crítica
Superfície não crítica

Figure 1a: Examples of High-touch Items and Surfaces in the Health Care Environment

Qual a diferença entre a limpeza adequada de um Hotel e de Hospital?

Hotel

Limpos e sem sujeira visível:

Pisos e rodapés

Paredes, teto e portas

Mobiliário, parapeitos, telefones, quadros, espelhos, carpetes

Banheiro completo

Todos os equipamentos do quarto

Lixeiras

Trocar e/ou consertar itens quebrados ou com mau funcionamento

Hospital

Limpeza de Hotel

+

limpeza/desinfecção concorrente de superfícies mais tocadas

+

limpeza/desinfecção terminal de todo quarto, mobiliário, banheiro, etc

+

Monitoração periódica da qualidade do processo com posterior feedback e educação.

Medidas de Prevenção e Controle de IRAS

As medidas propostas estão baseadas nos mecanismos de transmissão.

- ✓ Precauções Padrão
- ✓ Precauções durante o Contato
- ✓ Precauções por gotículas
- ✓ Precauções por aerossóis

Precauções empíricas

Precauções em Ambiente Protetor

Precaução Padrão no ambiente

- ✓ Limpeza e desinfecção de superfícies não críticas em áreas assistenciais fazem parte das Precauções Padrão. Em geral, estes procedimentos não precisam ser alterados para pacientes em Precauções por Contato.
- ✓ Limpeza e desinfecção de superfícies críticas (frequentemente tocadas pelo paciente ou equipe de saúde) devem ser realizadas com maior periodicidade com produtos adequados.
- ✓ A frequência da limpeza pode ser padronizada segundo nível de higiene do paciente, do grau de contaminação ambiental e para alguns agentes infecciosos com reservatório intestinal.

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M and HICPAC, 2007 Guideline for Isolation Precautions, June 2007.

<http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf>

Microbiota normal:

Trato Respiratório ➔ *S. viridans*
S. aureus
Neisseria sp

Boca ➔ *Candida sp*

Trato Intestinal ➔ maioria anaeróbios
1 a 4% aeróbios
(*Enterococcus*, *Pseudomonas*)

Trato Genital ➔ Bacteróides

Pele ➔ *S. epidermidis*

Microbiota do intestino
± 1.000.000.000 microrganismos

Contaminação das mãos com a pele do paciente

Pacientes colonizados ou infectados = FONTES DE INFECÇÃO

- ✓ 10^7 partículas eliminadas por dia
- ✓ 10% contem bactérias viáveis

Sobrevivência no ambiente: uma revisão sistemática

Type of bacterium	Duration of persistence (range)
<i>Acinetobacter spp.</i>	de 3 a 5 meses
<i>Bordetella pertussis</i>	3 – 5 days
<i>Campylobacter jejuni</i>	up to 6 days
<i>Clostridium difficile</i> (esporos)	5 meses
<i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>C. trachomatis</i>	≤ 30 hours
<i>Chlamydia psittaci</i>	15 days
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	7 days – 6 months
<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	1–8 days
<i>Escherichia coli</i>	1.5 hours – 16 months
<i>Enterococcus spp</i> (VRE ou VSE)	de 5 a 4 meses
<i>Haemophilus influenzae</i>	12 days
<i>Helicobacter pylori</i>	≤ 90 minutes
<i>Klebsiella spp.</i>	2 hours to > 30 months
<i>Listeria spp.</i>	1 day – months
<i>Mycobacterium bovis</i>	> 2 months
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1 day – 4 months
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	1 – 3 days
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	6 horas a 16 meses; em local úmido até 5 semanas
<i>Salmonella typhi</i>	6 hours – 4 weeks
<i>Salmonella typhimurium</i>	10 days – 4.2 years
<i>Salmonella spp.</i>	1 day
<i>Serratia marcescens</i>	3 days – 2 months; on dry floor: 5 weeks
<i>Shigella spp.</i>	2 days – 5 months
<i>Staphylococcus aureus</i> , incluindo MRSA	de 7 dias a 7 meses
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	1 – 20 days
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3 days – 6.5 months
<i>Vibrio cholerae</i>	1 – 7 days

Presença de microrganismos nas superfícies ambientais depende:

- ✓ Número de pessoas que estiveram ou estão no ambiente;
- ✓ Volume de atividades;
- ✓ Presença de umidade local;
- ✓ Presença de superfícies capazes de manter o microrganismo vivo e em crescimento;
- ✓ Técnica de remoção da sujeira – limpeza da área;
- ✓ Tipo de superfície (horizontal ou vertical).

Segundo vários estudos, 70% das superfícies ambientais nos quartos de pacientes colonizados ou infectados com microrganismos MR estão contaminadas.

Contaminação das mãos ambiente

FIGURA. Quartos ocupados X Limpos - porcentagem de cultura após contato com superfícies próximas ao paciente
 VRE = vancomycin resistant *Enterococcus*; GNB = *gram-negative bacillus*.

Contaminação bacteriana de equipamentos de comunicação no ambiente operatório

Table I Number and type of bacterial growth recovered per type of device

Contaminação de teclado de computador por VRE, MRSA e outros.

Infection control and hospital epidemiology april 2006, vol. 27, no. 4

Device	Mobile phones (%) (N = 46)	Pagers (%) (N = 27)	Personal digital assistants (%) (N = 5)
Gram positive	1 (2.2)	0 (0)	2 (40)
Gram negative	1 (2.17)	0 (0)	0 (0)
Fungi	0 (0)	1 (3.7)	0 (0)
Anaerobes	1 (2.17)	0 (0)	0 (0)

Photo 6: Clean linen stored on open shelves on Mercer ward, Maidstone Hospital (15 November 2006)

Photo 4: Dirty commode in Accident and Emergency, Maidstone Hospital (15 November 2006)

commodes found that half of the staff were using alcohol wipes to clean the commodes, as opposed to soap and water. Similarly, the majority of staff, when asked, told us that they

Photo 5: Cups observed in sink of clean utility room on Culpepper ward, Maidstone Hospital (3 January 2007)

Surto *C difficile* foi correlacionado com contaminação ambiental

Materiais, utensílios e produtos

É fundamental a manutenção de rotinas padronizadas e treinamento adequado e constante de toda equipe.

Gincana

Participação de campanhas nas unidades

Filme para discussão de erros e acertos

Jogos com equipe de higiene

Aquilo que escuto, esqueço
Aquilo que vejo, lembro
Aquilo que pratico, realizo!
Confúcius

Medidas ambientais

- ✓ Durante surtos de infecção em que os reservatórios ambientais podem estar implicados, uma revisão criteriosa destes processos deve ser realizada.
- ✓ A aderência aos processos deve ser monitorada e reforçada.
- ✓ Utilizar apenas detergentes/desinfetantes com registros adequados
- ✓ Utilizar produtos conforme a recomendação do fabricante e que sejam de fácil manuseio para a equipe.

Outros microrganismos têm sido bastante estudados.....

Norovirus:

- Responsável por 90% das diarreias não bacterianas e por 20% dos surtos importantes. Mais frequente no inverno.
- Nos EUA 23 milhões de pessoas infectadas por ano, com 100 mil mortes (principalmente crianças < 5 anos).
- Transmissão fecal-oral, alimentos/água

Clostridium difficile:

- Bactéria Gram-positiva anaeróbia, produz esporos e toxinas (A e B).
- Fatores de risco: uso prolongado de antibióticos e internação prolongada.
- Transmissão: paciente colonizado pelo organismo – atm desequilibra a flora intestinal – proliferação de *Clostridium difficile* – diarreia, mãos e ambiente.

Acinetobacter spp.:

- Bactéria Gram-negativa, fermentador aeróbia.
- Fatores de risco: uso prolongado de UTI, uso de antibióticos de amplo espectro, dispositivos invasivos, trauma/queimados, imunossuprimidos.
- Transmissão: contato direto com o paciente, equipamentos e ambiente.

Para estes casos recomenda-se a limpeza/desinfecção das superfícies críticas (altamente tocadas pelo paciente e equipe de saúde). Para Norovirus e *Clostridium difficile* as soluções de Hipoclorito de Na (1:10) devem ser utilizadas em situações de surto de infecção.

Ambiente X Precauções durante o Contato

✓ Esteja certo de que estes quartos são priorizados para aumentar a frequência da limpeza e desinfecção ambiental (no mínimo diariamente) focando principalmente superfícies freqüentemente tocadas pelo paciente ou equipe de saúde (grades da cama, cabeceira, criado mudo, lavatórios, maçanetas, etc) além de superfícies de equipamento próximos ao paciente.

Limpeza criteriosa?!

- Objetivo: avaliar a qualidade da limpeza terminal utilizando simulação com produto fluorescente
- Período do estudo: 4 meses
- Local: três hospitais
- Número de situações avaliadas: 60, 54 e 43 quartos em cada hospital
- **Resultados: apenas em 47% das situações a limpeza foi efetiva (45, 42 e 56% simultaneamente)**

Indicadores

“Não se gerencia o que não se mede; não se mede o que não se define; não se define o que não se entende; não há sucesso no que não se gerencia”

William Edwards Deming

Indicadores de Qualidade

Indicador de resultado - apresentam informações sobre as ocorrências

- Número de queixas no SAC que relacionam-se com o serviço de higiene
- Taxa de infecção relacionada à assistência à saúde por microrganismos importantes na transmissão ambiental – *Clostridium difficile*, rotavirus, *Acinetobacter baumannii*, etc
- Taxa de acidentes ocupacionais envolvendo PFC e matéria orgânica
- Taxa de quebra de equipamentos

Exemplos:

Casos de *Clostridium difficile* n o 11 D - aquisição hospitalar no mês dezembro 2012

Casos			Nov	Dezembro																															
Paciente	Admissão	Sintomas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
A	12/11/2012	28/11	1121	+																															
											1106																								
C	30/11/2012	13/12	282													+	1101																		1102

⊕ Data positividade para *C. difficile*

Evolução Limpeza Terminal Salas Cirúrgicas CC5º

Indicador de processo - apresentam informações sobre os passos de determinada ação

- Avaliação da adequada diluição dos produtos padronizados + manutenção de frascos e galões com identificação adequada
- Avaliação do processo de limpeza terminal e concorrente
- Utilização adequada de EPI

Métodos de monitoramento	Método	Quem	Vantagens	Desvantagens
Avaliação visual	Aplicação de checklist	Supervisores de higiene (contínua//) SCIH (periódica//)	Baixo custo Avaliação rápida de falhas graves	Não identifica presença de microrganismos Subjetivo
Método fluorescente	Aplicação de gel transparente invisível a olho nu, utilização de lâmpada ultravioleta	Supervisores de higiene (contínua//) SCIH (periódica//)	Objetividade, simplicidade, rapidez nos resultados, fácil execução, relativa// barato, educativo	Não identifica presença de microrganismos Requer rigor na mensuração
ATP bioluminescência	O ATP é uma molécula de energia presente em plantas, animais e microrganismos	Profissionais treinados	Resultados rápidos, fácil execução, educativo	Custo alto, dificuldade de Benchmarking, resultados falso-positivos, baixa sensibilidade, alguns desinfetantes interferem no resultado
Avaliações microbiológicas	Cultura de superfícies – indicado apenas em momentos de surtos	Profissionais treinados Laboratório	Avalia a contaminação das superfícies	Custo elevado, demora no resultado, recursos especiais

Monitoramento higiene ambiental

Observação direta - formulário

Center: ABC Surgery Center

Functional Area: Operating Room 1

Audit Date: September 30, 2010

Auditor: Jane Doe

Surface or Element	Assessment			Comments	Date Action Taken	Action/Resolu
	Acceptable	Unacceptable	N/A			
Walls		x		Small splatter on rear wall	30/09/2010	Cleaned w/approved d
Ceiling		x		Small splatter left rear quadrant	30/09/2010	Cleaned w/approved d
Floor	x					
Doors, including push pla	x					
Ducts, grills and vents	x					
Surgical lights and track	x					
Counters	x					
Shelves	x					
Other horizontal surfaces	x					
Cabinets, including hand	x					
Light switches	x					
Fixed/ceiling mounted eq	x					
Other equipment	x					
OR table	x					
Other furniture	x					
Phone	x					
Computer and keyboard	x					
Other	x					

Monitoramento higiene ambiental

ATP: adenosina trifosfato – presente células animais, vegetais, bacterianas e fúngicas (Unidade Relativa de Luz - URL)

Swab superfície

Leitura no luminômetro

Monitoramento higiene ambiental

Cultura superfícies – não se recomenda de rotina (investigação epidemiológica)

Contato direto com placa ágar: superfícies planas

Swabs celulose: áreas amplas

Shea 2013

Conformidade na limpeza terminal por tipo de superfície do quarto (n=124)

Conformidade na Limpeza de superfícies do Quarto.
Outubro a dezembro 2011

Conformidade na limpeza terminal por tipo de superfície do banheiro (n=89)

Avaliação de limpeza – identificando problemas nos processos

Indicador de estrutura – apresentam problemas de área física, fluxos, materiais, etc.

- Avaliação da disponibilidade de EPI
- Avaliação das condições do carro funcional – organização, limpeza, itens identificados, etc
- Proporção de profissionais da higiene versus área a ser limpa
- Proporção de profissionais a higiene versus limpeza adequada das áreas

Comunicando os dados – *feed back*

Positivo X Negativo

- Objetividade
- Fácil interpretação
- Curto e conciso
- Estratégias visuais
 - Gráficos
 - Tabelas
 - Desenhos....

Indicadores na mão

Reconhecimento do problema

**Continuidade da
Vigilância**

Indicadores Epidemiológicos de resultado

- Cada vez mais utilizados como indicadores de qualidade;
- Indicadores são um ponto de partida para identificação e resolução de problemas;
- Toda a informação deve levar à ação;
- Toda a decisão a respeito de medidas de controle deve envolver a equipe.

Processos contínuos de melhoria da qualidade

Recursos humanos

Recursos materiais

Estrutura

Assistência segura:

Processos

Obrigada!

claudia@einstein.br